

AVERTISSEMENTS AGRICOLES

PIP 23-5-67 840756
BULLETIN
TECHNIQUE
DES
STATIONS
D'AVERTISSEMENTS
AGRICOLES

PUBLICATION PÉRIODIQUE

ÉDITION de la STATION de BORDEAUX (Tél. 92.06.25 et 92.26.94)

ABONNEMENT ANNUEL

(GIRONDE, DORDOGNE, LOT-&-GARONNE, LANDES,
BASSES-PYRÉNÉES, CHARENTE, CHARENTE-MARITIME)

25 F

Régisseur de recettes de la Protection des Végétaux, Chemin d'Artigues, CENON (Gironde)
C. C. P. : BORDEAUX 6707-65

Supplément N° 2 au Bulletin Technique N° 80 de Mai 1967

1967-15

AVERTISSEMENTS

V I G N E

Mildiou : Comme nous l'avons précisé, les conditions climatiques du printemps n'ont pas été, jusqu'ici, favorables à la maturation des oeufs d'hiver. Cependant, les pluies d'orages ont pu permettre quelques évolutions dans des situations privilégiées.

En raison de la végétation active, un traitement devrait donc être appliqué dès à présent pour prévenir la formation des foyers primaires.

Supprimer dès que possible les rejets et les pousses basses se trouvant sur les souches.

Vers de la grappe : (Eudémis et Cochylis)

Les éclosions de papillons sont pratiquement terminées. Les vols assez importants cette année ont commencé dès la mi avril, mais le faible développement de la vigne et les températures nocturnes assez basses ont empêché le dépôt d'oeufs précoces.

Par contre, depuis le 7 Mai les conditions sont favorables à la ponte et les premières éclosions importantes de larves sont à prévoir à partir du 20 Mai.

Nous conseillons donc dès à présent un premier traitement par pulvérisation dans les vignes généralement atteintes. A ce propos nous rappelons que le D.D.T. n'est actif que sur l'Eudémis et qu'il ne doit pas être utilisé dans les vignobles où sévit la Cochylis.

ARBRES FRUITIERS

Tavelures des Poiriers et des Pommiers : Les nombreuses et importantes pluies d'orages du début de la semaine ont délavé les produits.

Le traitement devrait donc être renouvelé, en particulier dans les vergers où des taches ont été observées.

Carpocapse des Prunes : Le premier vol des papillons est continu depuis le 15 avril. Les premières pontes ont eu lieu dès la fin d'avril et des larves ont été observées vers le 10 Mai. Mais les pontes importantes ont été déposées au cours de la période chaude qui a débuté le 7 Mai et les éclosions de chenilles sont en cours.

Dans de nombreux vergers où la prévision de récolte est moyenne cette première attaque peut atteindre 5 à 10 % des fruits et provoquer par la suite une porte d'entrée aux infections de Monilia.

Nous conseillons donc un premier traitement dès réception de cette note avec un Oléoparathion à 0,75 %, un Parathion à 25-30 grs de MA/HL, du Malathion ou Oléomalathion ou bien du Diazinon ou Oléodiazinon.

P237

.../...

.../...

INFORMATIONS

Rouille du Prunier : Pour prévenir les attaques de Rouille, un fongicide à base de cuivre, de Zinèbe ou de Ziramé pourra être ajouté à la bouillie préconisée contre le carpocapse en tenant compte des compatibilités.

POMMES DE TERRE

Mildiou : Dans les cultures de primeurs ou les plants sont déjà bien développés, il convient de prévoir un traitement dès à présent.

Bordeaux, le 18 Mai 1967

Le Contrôleur
chargé des Avertissements
C. ROUSSEL

L'Inspecteur
de la Protection des Végétaux
J. BRUNETEAU